

爱特德美™

璞丽提拉

3.2 % - 40 mg (H-HA) + 40 mg (L-HA) / 2.5 mL

1.0 % - 25 mg (PN) / 2.5 mL


Hyaluronic acid sodium salt + Polynucleotide

2.5 mL pre-filled syringe



机制

稳定的H+L透明质酸混合复合物



高度恢复保湿能力

引导细胞外基质在以下方面进行重塑

弹性

支撑

通过稳定的皮肤结构实现提升效果

促进并维持

纤维母细胞

角质形成细胞


脂肪细胞

多核苷酸DNA聚合物



焕活与再生作用

通过激活4种生长因子和细胞因子



刺激胶原蛋白和弹性蛋白的合成

通过补救通路

适应症

组织重塑与改善皮肤松弛

面部

颈部

身体

手部

技术



L-HA

40mg 透明质酸
低分子量
(200 ~ 400 kDa)



H-HA

40mg 透明质酸
高分子量
(1300 ~ 1500 kDa)



从简单的
混合开始

ABEP™

HYBRID技术
PCT国际专利



简单的混合通过酸碱平衡形成混合复合物，
基于ABEP工艺

(不使用化学交联剂)


PURIHILO's H+L HA

稳定的混合协同复合物

高度可控

低粘度

低炎症反应



- 通过避免使用热合成技术防止透明质酸变性
- 高透明质酸浓度 (80mg / 2.5 mL)
- 不含BDDE或其他化学剂
- 稳定的混合透明质酸，
其持续时间可与低交联凝胶相媲美

PURIHILO's PN (Polynucleotide)


包含于璞丽提拉中



- 璞丽提拉仅使用通过CoA分析取得
高分的认证医疗级多核苷酸 (PN)。
- 这种聚合物从真皮层修复肌肤，
预防衰老，并重塑弹性。

临床研究


保湿效果



每种产品均在人体皮肤真皮细胞上进行处理,并比较了皮肤保湿因子基因的表达水平。

**AQP-1,3 (水通道蛋白-1,3): 水分运输通道基因

胶原蛋白合成效果




每种产品均在人体皮肤真皮细胞上进行处理,并比较了胶原蛋白合成因子基因的表达水平。


**DDL-1A, 3A (I型和III型胶原): 胶原蛋白合成基因

组织重塑

璞丽提拉旨在重塑细胞外基质,帮助您实现自然年轻的外观,同时减少皱纹和松弛的皮肤。



在整个研究过程中,WSRS“皱纹严重程度”显著减少。
注意:*P<0.05 与 T0 比较。
缩写:WSRS, 皱纹严重程度评级量表。



在整个研究过程中,WSRS“皱纹严重程度”显著减少。
注意:*P<0.05 与 T0 比较。
缩写:FVLS, 面部体积流失评分量表。

前后对比




■ 两次治疗 (间隔一个月)

■ (A) 治疗前

患者的皮肤看起来干燥, 出现了许多皱纹, 尤其是鱼尾纹、鼻唇沟以及上唇的垂直皱纹。

■ (B) 治疗后

通过皮肤再生, 皮肤变得更健康、更紧致, 甚至还出现了一些美白效果。



■ 研究对象: 61岁女性,

右侧鼻唇沟接受透明质酸填充剂真皮注射治疗。

(A) 基线(治疗前), (B) 治疗后4周,

(C) 治疗后12周, (D) 治疗后24周




更多关于PURIHILO PN
的临床试验与流程数据

PURIHILO PN PDF手册

爱特德美™

璞丽提拉



H+L & PN

高浓度保湿与再生

HA concentration (80mg / 2.5 mL) & 多核苷酸 (25mg / 2.5 mL)

通过酸碱平衡 (ABEP) 实现H+L的合成与稳定

ABEP™

HYBRID技术
PCT国际专利



- 通过避免使用热合成技术防止透明质酸变性
- 不含BDDE或其他交联剂

治疗指南

璞丽眼周修复可适用于现有的所有美塑疗法技术。

MTS

通过微针在表皮上形成微小通道,从而促进有效成分的吸收。

点阵与射频美容设备

Fractional and RF Aesthetic Devices

可使用如Potenza或Secret Laser等美容医疗设备进行应用。

非侵入式美容设备

Non-Invasive Aesthetic Devices

适用于冷冻疗法设备 (如Cryocell)、超声设备 (如LDM)、
光疗设备 (如LED) 等美容疗法。