

AETERDERM®

LEXYFILL

Fill Your Luxury Beauty

&

LEXYFILL VOLUME CREAM






Fill Your Luxury Beauty


Característica

Menor viscosidade? Mas maior elasticidade!

Mesmo sem misturar com solução salina, você pode aspirar facilmente do frasco.



Portanto, não há perda de volume nem deformação causada pela solução salina. E ele apresentará uma elasticidade incrível.



Como resultado, você pode realizar um tratamento mais sofisticado. ✂


Criamos um preenchedor corporal com estas características incríveis através de um longo tempo de reticulação a baixa temperatura

para uma modelação corporal precisa




Por que o LEXYFILL é o mais seguro? Por que o LEXYFILL de alta elasticidade?

Outros preenchedores




So utiliza moléculas grandes de AH.




Utiliza grandes quantidades de **BDDE** o que pode causar efeitos colaterais significativos.

Além disso esses preenchedores são muito difíceis de aspirar do frasco. Por isso, é necessário combiná-los com solução salina e agitar para misturar.




Quando você adiciona a solução salina e agita para misturar, a estrutura de reticulação do AH fica totalmente quebrada. Isso pode levar ao aumento de BDDE residual e a efeitos colaterais graves e choque.

AETERDERM® **LEXYFILL** Body Filler




So foram inseridas moléculas pequenas de AH. Assim, apresenta maior hidratação e elasticidade.



Devido a esta estrutura do AH, a reticulação pode ser realizada utilizando quantidades pequenas de **BDDE**.

Assim, a probabilidade de efeitos colaterais é significativamente reduzida.




LEXYFILL pode ser facilmente aspirado com uma seringa sem necessidade de misturar com solução salina, podendo assim ser injetado com a estrutura do AH intacta.

Ingredientes Principais

Ácido Hialurônico

AH reticulado bifásico
adequado para volumização corporal



Repita 14 vezes para remover os 3 tipos de toxinas. Preveão completa de efeitos colaterais

- ⦿ Residual BDDE
- ⦿ Endotoxin
- ⦿ Protein

Maximizar a elasticidade e a retenção, combinando moléculas grandes e pequenas de AH.



Concentração de AH	24 mg / mL
MOD (Degree of Modification, mol%)	3.85 %
Tipo de Gel	Biphasic
Armazenamento (G')	100 - 250 Pa
Força de injeção (N) (30G UTW)	20 N

ESTUDOS NÃO CLINICOS

Teste de viscosidade & elasticidade



Forma inicial




Após 1 hora



Após 6 horas



Após 12 horas



Após 24 horas





AETERDERM®



LEXYFILL

ESTUDOS CLINICOS

Procedimento de aumento mamário





References) Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;11:3-13



References) Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;17:10-15

Procedimento de aumento de glúteos




References) Augmentation of buttocks by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;21:35-19


TRATAMENTO

Áreas de tratamento


Parte frontal do corpo



Vista lateral




Vista traseira



✱ Se o paciente apresentar flacidez cutânea severa ou ptose acentuada dos glúteos, é fortemente recomendado não injetar preenchedor de ácido hialurônico na parte inferior dos glúteos.

Áreas de Injeção



Cânula recomendada

- Aumento dos seios — 14G 90mm micro-canula
- Aumento da parte superior — 20G 70mm micro-canula
- Aumento dos glúteos — 18G 70mm or 18G 90mm micro-canula

Tratamento

- Verifique se o paciente está em condições adequadas para o procedimento.
- Lave a área de tratamento com água e sabão.
- Desinfete a área de tratamento com álcool ou outro antisséptico.
- Injete o preenchedor corporal LEXYFILL de ácido hialurônico no plano de tecido subcutâneo da área de tratamento, utilizando agulha de parede fina ou cânula.
- Após a injeção, a área tratada deve ser massageada suavemente para que se adapte ao contorno dos tecidos circundantes.

※ As instruções detalhadas de aplicação estão incluídas no manual que acompanha o produto.

Precauções pós-tratamento

- Aplique compressas de gelo na área tratada por 15 a 20 minutos de cada vez, várias vezes ao dia, para ajudar a reduzir o inchaço e as contusões.
- Evite exercer pressão sobre a área tratada por pelo menos 24 horas após o procedimento.
- Evite por pelo menos 48 horas após o procedimento.
 - Atividade física intensa ou exercício físico
 - Álcool & tabaco
 - Banhos quentes, saunas e banhos de vapor

※ As precauções detalhadas estão incluídas no manual que acompanha o produto.

Volumização sobre volumização

LEXYFILL VOLUME CREAM

Creamos a ^{AETERDERM®} **LEXYFILL VOLUME CREAM**

Como resultado da colaboração com ^{AETERDERM®} **LEXYFILL** desenvolvendo uma fórmula ideal para maximizar o efeito do tratamento e prevenir os efeitos colaterais do preenchedor.

■ Função 1

Volumiza o seu corpo por meio da proliferação de células de gordura com VOLUFILINE

■ Função 2

Torna a pele mais firme e elástica por meio da biossíntese de colágeno e elastina

■ Função 3

Prevenção e tratamento de estrias

■ Função 4

Hidratação e ação calmante da pele



Aplique este creme suavemente na área tratada com LEXYFILL duas vezes ao dia por 10 a 20 minutos cada vez.

Ele maximiza o efeito do tratamento com preenchedor corporal, mantém o volume a longo prazo e cria uma forma mais natural por meio da proliferação natural das células de gordura.

^{AETERDERM®}
LEXYFILL
VOLUME CREAM
Fill Your Luxury Beauty



Função 1

Poliferação de adipócitos por VOLUFILINE™

Contém 50.000 ppm de VOLUFILINE, um ingrediente patenteado internacionalmente que foi clinicamente testado para a proliferação de células de gordura.

AETEROID™
LEXYFILL VOLUME CREAM



VOLUFILINE™



Sarsasapogenin

Ativação da proliferação de células de gordura

Estimula a absorção de lipídios por meio da ativação da via da glicose/frutose




Hydrogenated Polyisobutene


Suprimento de óleo

Estudos Clínicos da VOLUFILINE™

T1 Taxa de aumento de células de gordura com VOLUFILINE



T2 Taxa de aumento de células de gordura com VOLUFILINE




References) Sci Rep 2024;(22)

T1 Foto microscópica de células de gordura com VOLUFILINE


0% of VOLUFILINE



0.5% of VOLUFILINE



1% of VOLUFILINE




Red colored Fat cells




References) Sci Rep 2024;(27)

T2 MRI de células de gordura com VOLUFILINE

0% of VOLUFILINE



1% of VOLUFILINE




Fat cells

References) Sci Rep 2024;(31)

Função 2

Biossíntese de Colágeno & Elastina


Comparado ao ácido hialurônico preenchido por meio de preenchedor, não há colágeno e elastina suficientes para sustentá-lo, por isso a elasticidade e a retenção podem ser fracas. O LEXYFILL VOLUME CREAM resolve esses problemas por meio da elasticidade.




Estrutura normal do tecido cutâneo

Maiores componentes da pele

- Ácido Hialurônico
- Colágeno
- Elastina



Suplementação de preenchedor de AH na pele




estimula a produção de colágeno e elastina através de lipossomas

⦿ Estrutura Lipossoma




A estrutura de lipossoma permite que os ingredientes ativos penetrem profundamente na pele.



Torna a pele mais firme e mais elástica.


Fortalece a elasticidade da pele e a retenção do preenchedor de AH.



- ⦿ Aumento da biossíntese de colágeno e elastina
- ⦿ Ativação do EGF (Fator de Crescimento Epidérmico)

Função 3

Prevenção e recuperação de estrias



Após o tratamento com body filler, podem surgir estrias devido ao aumento súbito de volume. O LEXYFILL VOLUME CREAM foi desenvolvido como uma fórmula para solucionar esses problemas.

LEXYFILL VOLUME CREAM

Panthenol

Shea Butter

- Regeneração da pele
- Remove estrias rubras e previne a formação de cicatrizes

LEXYFILL VOLUME CREAM

Magnolia Bark Extract

Acetylhexapeptide-8

Palmitoyl Tetrapeptide-7

Palmitoyl Pentapeptide-4

Copper Tripeptide-1

- Repara os danos da pele
- Fortalecimento da barreira cutânea (aumento do SPT)

Função 4

Hidratação e ação calmante da pele



Mesmo quando o procedimento é realizado com cânula, a estimulação da camada dérmica provoca calor, evapora a umidade da pele e a pele ressecada perde facilmente a elasticidade, podendo levar ao aparecimento de cicatrizes de estrias (striae distensae).

O LEXYFILL VOLUME CREAM possui uma fórmula eficaz para prevenir esses efeitos colaterais.

LEXYFILL VOLUME CREAM

Allantoin

Phyto-Oligo

Ceracare AC 45 complex

7 Types molecules of Hyaluronic Acid

- Hidratação profunda
- Redução da evaporação da umidade

Fill Your Luxury Beauty



AETERDERM®

LEXYFILL

[COMPOSIÇÃO]

Cross-linked hyaluronic acid	24 mg / mL
Phosphate-buffered saline	q.s.

[EMBALAGEM]

60cc x 1 Vial / Caixa

[ARMAZENAMENTO]

Deve ser armazenado à temperatura ambiente (1–30 °C), longe da luz solar direta.

AETERDERM®

LEXYFILL VOLUME CREAM

[INGREDIENTES]

Water, Hydrogenated Polyisobutene, Butylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Cetearyl Alcohol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Glyceryl Stearate SE, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vinyl Dimethicone, Panthenol, C14-22 Alcohols, Ceramide NP, C12-20 Alkyl Glucoside, Dipropylene Glycol, Carbomer, Arginine, Xanthan Gum, Glyceryl Polyacrylate, Magnolia Officinalis Bark Extract, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Sodium Stearoyl Glutamate, Hydrogenated Lecithin, Adenosine, Glyceryl Stearate, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Cholesterol, Ceramide NS, Ceramide AS, Ceramide AP, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Althaea Rosea Root Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Glucose, Caulerpa Lentillifera Extract, Codium Fragile Extract, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Tocopherol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Pentapeptide-4, Potassium Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Oligopeptide-1, Ceramide EOP

[Embalagem]

150mL / Caixa