

AETERDERM®



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating



Language AR



AETERDERM®

PURIPDRN

AETERDERM®

PURIPDRM





يعزز تكوين جميع البروتينات



النياسيناميد


PDRN
بولي
ديوكسيريبونوكليوتيد


HA
حمض الهيالورونيك

غنية وشابة بنية البشرة


يعمل **PDRN المنقّى** كمصدر مباشر للحمض النووي، مما يزود البشرة بالطاقة اللازمة للتجدد الذاتي. وبصفته أحد الأشكال الأساسية للأحماض النووية، فإنه يساهم في استعادة الكولاجين والإيلاستين وتجدد الخلايا.



في غياب كميات كافية من الأحماض النووية، تفقد الخلايا قدرتها على التجدد، وتتدهور تدريجيًا، وفي النهاية تدخل في مرحلة الشيخوخة وتموت.

ترطيب وتهدئة نسيج البشرة


يستطيع **حمض الهيالورونيك** في PURI PDRN جذب والاحتفاظ بما يصل إلى 1000 ضعف وزنه من الماء، مما يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على ترطيب البشرة والخلايا ودعم وظائفها الطبيعية بشكل سليم.



توحيد وإشراق لون البشرة

يساعد **النياسيناميد** الموجود في PURI PDRN على الوقاية من تصبغات الميلانين، مما يمنح البشرة لونًا أكثر إشراقًا وتجانسًا.

كما يدعم **النياسيناميد** الوظائف العامة للبشرة، ويعزز التأثيرات المتعددة لإصلاح البشرة التي يوفرها **PDRN المنقى**.



نتائج التجارب السريرية

تم الحصول على البيانات السريرية على مدى 4 أشهر، بعد 4 جلسات علاجية بفواصل زمنية قدرها أسبوعان بين كل جلسة، تلتها مرحلة متابعة لمدة 8 أسابيع.


كثافة البشرة




متوسط زيادة قدره
↑ **%41.85**




متوسط زيادة قدره
↑ **%64.85**



قبل



بعد جلستين



بعد 4 جلسات مع
متابعة لمدة 8 أسابيع

تم إجراء عمليات المسح أسفل العظم الوجني باستخدام خط الكولوميلا، إلا أن الموقع الدقيق قد يختلف قليلًا نظرًا للحساسية العالية على مستوى الميكرومتر.

تخفيف التجاعيد



متوسط انخفاض قدره


↓ %26.96




متوسط انخفاض قدره

↓ %34.85


بعد 17 أسبوعًا




قبل



بعد 16 أسبوعًا




قبل




تم استخدام عمق التجاعيد كمؤشر رئيسي، نظرًا لأن التجاعيد الأعمق تكون عادةً أطول.

شدّ البشرة



ترسب الميلانين

تركيز الميلانين داخل البشرة (ميكروغرام/ملغ – $\mu\text{g}/\text{mg}$)



القياس الكمي لتركيز الميلانين في الأنسجة باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC).



متوسط انخفاض قدره
↓ **18.40%**




متوسط انخفاض قدره
↓ **18.15%**

تأثير تفتيح البشرة




متوسط زيادة الإشراف
↑ **6.88%**



متوسط زيادة الإشراف
↑ **5.97%**


بعد 17 أسبوعًا



2025.12.24



قبل



2025.08.24



$L^* 66.64$
تم القياس باستخدام جهاز Chroma Meter CR-400

$L^* 63.42$
تم القياس باستخدام جهاز Chroma Meter CR-400

تم استخدام عمق التجاعيد كمؤشر رئيسي، نظرًا لأن التجاعيد الأعمق تكون عادةً أطول.

تقليل حجم المسام



متوسط الانخفاض
↓ %25.73



متوسط الانخفاض
↓ %27.31



بروتوكول وإرشادات العلاج

طريقة العلاج والأدوات

- الحقن متعدد الإبر (Meso Gun)
استخدام رؤوس متعددة الإبر بـ 5 أو 9 إبر، مقاس 31~G33
- الحقن اليدوي
استخدام إبر مفردة بمقاس 32~G34

العلاج الرئيسي



جلسات المتابعة

بعد إتمام الدورة الرئيسية، مع فاصل زمني من 3 إلى 6 أشهر

أربع جلسات إضافية بفاصل 2-3 أسابيع بين كل جلسة

- يمكن تعديل الفاصل الزمني والتكرار بناءً على

- مرونة البشرة
- درجة التجاعيد
- جفاف البشرة
- سرعة التعافي
- ظهور الحبوب أو الحساسية

ينطبق على

- أجهزة الترددات الراديوية والليزر (Secret RF، Potenza، وغيرها)
تعزز تجديد الكولاجين وتزيد من التأثير التآزري لعلاج PURI PDRN.
- أجهزة التعافي غير الجراحية (LED، LDM، Cryocell، وغيرها)
تدعم تهدئة البشرة والتعافي بعد العلاج، مما يعزز النتائج الإجمالية عند دمجها مع PURI PDRN.

AETERDERM®

PURI PDRN



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating

[التركيب]

- 25 مجم حمض الهيالورونيك
- 5 مجم بولي ديوكسيريبونوكليوتيد (PDRN)
- 5 مجم النياسيناميد

[التعبئة]

2.5 مل × 5 حقن / علبة

